

乡村全科执业助理医师资格考试考前 100 考点

- 1.发热的热度:低热(37.3~38℃)中高热(38~39℃)超高热(>41℃)。
- 2.发热的热型:稽留热、弛张热、间歇热、波张热、回归热、不规则热。
- 3.丘疹:局限性、实质性、隆起性。
- 4.麻疹:口腔黏膜科氏斑,疹退后有色素沉着及脱屑。
- 5.风疹:疹退后无色素沉着及脱屑。
- 6.猩红热:充血发红疹退后脱皮。
- 7.水痘:可出现斑丘疹、丘疹、水疱、结痂,趣味记忆为“四世同堂”。
- 8.伤寒:玫瑰疹,肥达反应阳性。
- 9.白色泡沫黏液痰:支气管炎和支气管哮喘。
- 10.红色胶样痰:肺炎克雷伯菌肺炎。
- 11.黄色脓样痰:化脓性感染。
- 12.果酱样痰:肺吸虫病。
- 13.强心苷可致黄、绿色视、心脏毒性及胃肠道反应。
- 14.大量稀薄痰:肺泡细胞癌。
- 15.铁锈色痰:大叶性肺炎。
- 16.小量咯血:24小时内咯血量小于100ml。
- 17.中等量咯血:24小时内咯血量100~500ml。
- 18.大咯血:24小时内咯血量超过500ml,或一次咯血量100~500ml。
- 19.鲜红色:肺结核、支气管扩张、肺脓肿和出血性疾病。
- 20.暗红色:二尖瓣狭窄。
- 21.黏稠暗红色血痰:肺栓塞。
- 22.粉红色泡沫痰:肺水肿(左心衰竭)。
- 23.心绞痛:胸骨后或心前区压榨性疼痛/闷痛,持续数分钟,休息或用硝酸酯类药物后可缓解。
- 24.急性心肌梗死:心前区与胸骨后剧烈疼痛,伴有濒死感和恐惧感,持续时间长,服硝酸甘油无效。
- 25.心悸最常见原因:心律失常。
- 26.食管癌:进行性吞咽困难。
- 27.反流性食管炎:反酸、烧心。
- 28.呕血:上消化道出血:柏油样便。
- 29.便血:下消化道出血:呈鲜红,为暗红色。
- 30.急性细菌性痢疾:黏液脓血便。
- 31.急性出血性坏死性肠炎:洗肉水样血便。
- 32.胃镜检查:明确上消化道出血病因的首选检查方法。

33. 结肠镜检查:诊断大肠及回肠末端病变的首选检查方法。
34. 尿频、尿急、尿痛:尿路刺激征。
35. 尿频伴尿急和尿痛:膀胱炎和尿道炎。
36. 尿路刺激征伴发热及腰痛:肾盂肾炎。
37. 尿频尿急伴血尿、午后低热、乏力盗汗:膀胱结核。
38. 尿频、尿急伴无痛性血尿:膀胱癌。
39. 老年男性,尿频伴尿线细、进行性排尿困难:前列腺增生。
40. 全程血尿:肾小球源性血尿、膀胱及输尿管开口以上部位。
41. 终末血尿:膀胱三角区或后尿道。
42. 不凝血尿:肾小球源性血尿。
43. 血丝、血块:非肾小球源性血尿。
44. 泌尿系肿瘤:无痛性肉眼血尿伴血块者。
45. 生殖器肿瘤:子宫肌瘤最常见。
46. 腰椎间盘突出症:直腿抬高试验阳性。
47. 结核性关节炎:脊柱最常见。
48. 全身性抽搐:为癫痫大发作。
49. 癫痫持续状态:治疗首选地西洋。
50. 肺炎链球菌:首选青霉素或阿莫西林,过敏者选用大环内酯类抗生素。
51. 面部青色主寒证、气滞、血瘀、疼痛、惊风。面部黄色主脾虚、湿证。
52. 淡白舌主气血两虚、阳虚。红舌主实热、阴虚。
53. 胖大舌多主水湿内停、痰湿热毒上泛。瘦薄舌多主气血两虚、阴虚火旺。
54. 舌淡胖大而润,舌边有齿痕者,多属寒湿壅盛,或阳虚水湿内停。
55. 舌质淡红而舌边有齿痕者,多为脾虚或气虚。
56. 白苔主表证、寒证、湿证。黄苔主热证、里证。
57. 恶寒重发热轻是风寒表证的特征。寒热往来有定时常见于疟疾。
58. 浮脉一般见于表证。沉脉多见于里证。迟脉多见于寒证。
59. 下肢内侧,内踝尖上八寸以下为足厥阴在前,足太阴在中,足少阴在后。
60. 前发际正中至后发际正中为 12 寸。眉间至前发际正中 3 寸。
61. 风寒感冒的常用中成药为:正柴胡饮颗粒、午时茶颗粒。
62. 风热感冒的常用中成药为:银翘解毒片、疏风解毒胶囊。
63. 暑湿感冒的常用中成药为:藿香正气片、暑湿感冒颗粒。
64. 血瘀胸痹的常用中成药为:通心络胶囊、冠脉宁片。
65. 风寒头痛的常用中成药为:川芎茶调散、头风痛胶囊。
66. 眩晕肝阳上亢的常用中成药为:天麻钩藤颗粒、养血清脑颗粒。
67. 胁痛肝郁气滞的常用中成药为:逍遥丸。
68. 泄泻食滞肠胃的常用中成药为:枳实导滞丸。
69. 银翘解毒丸功效为:疏风解表,清热解毒。用于风热感冒。

- 70.麝香保心丸功效为:芳香温通,益气强心。用于气滞血瘀所致的胸痹。
- 71.常见的心身疾病有:冠心病、消化性溃疡、原发性高血压、哮喘、功能性子宫出血、癌症等。
- 72.心理治疗的原则:(1)保密原则;(2)真诚原则;(3)“中立”原则;(4)回避原则。
- 73.医学伦理的基本原则,具体包括:尊重、有利、不伤害、公正四个原则。
- 74.乡村医生应当如实向患者或者其家属介绍病情,对超出一般医疗服务范围或者限于医疗条件和技术水平不能诊治的患者,应当及时转诊。
- 75.处方一般不得超过 7 日用量;急诊处方一般不得超过 3 日用量;
- 76.为门(急)诊患者开具的麻醉药品注射剂,每张处方为一次常用量;控缓释制剂,每张处方不得超过 7 日常用量;其他剂型,每张处方不得超过 3 日常用量。
- 77.第一类精神药品注射剂,每张处方为一次常用量;控缓释制剂,每张处方不得超过 7 日常用量;其他剂型,每张处方不得超过 3 日常用量。
- 78.第二类精神药品一般每张处方不得超过 7 日常用量;对于慢性病或某些特殊情况的患者,处方用量可以适当延长,医师应当注明理由。
- 79.为门(急)诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者开具的麻醉药品、第一类精神药品注射剂,每张处方不得超过 3 日常用量。
- 80.控缓释制剂,每张处方不得超过 15 日常用量;其他剂型,每张处方不得超过 7 日常用量。
- 81.为住院患者开具的麻醉药品和第一类精神药品处方应当逐日开具,每张处方为 1 日常用量。
- 82.普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限为 1 年,医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为 2 年,麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为 3 年。
- 83.盐酸哌替啶处方为一次常用量,仅限于医疗机构内使用。
- 84.目前,我国共有法定传染病 39 种,其中甲类 2 种、乙类 26 种、丙类 11 种。
- 85.在儿童出生后 1 个月内,其监护人应当到儿童居住地承担预防接种工作的接种单位为其办理预防接种证。
- 86.《突发公共卫生事件应急条例》规定,突发事件监测机构、医疗卫生机构和有关单位发现有下列情形之一的,应当在 2 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告。
- 87.有下列情形之一的,为假药:①药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符的;②以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的。
- 88.以隐性感染为主的疾病,如脊髓灰质炎。
- 89.潜伏期较长的传染病,如狂犬病、麻风。
- 90.传染病的流行必须具备三个基本环节,即传染源、传播途径和人群易感性。
- 91.对其他乙、丙类传染病病人、疑似病人和规定报告的病原携带者在诊断后,实行网络直报的责任报告单位应 24 小时内进行网络报告。
- 92.对甲类传染病的接触者应进行留验,即隔离观察。
- 93.对乙类和丙类传染病的接触者应施行医学观察。

94.对于在1周内,同一学校、幼儿园、自然村寨、社区、建筑工地等集体单位中发生20例及以上感染性腹泻病例,或死亡1例及以上应上报。

95.对于在1周内,同一学校、幼儿园等集体单位中发生10例及以上流行性腮腺炎病例应上报。

96.脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗各剂次的间隔时间应 ≥ 28 天。

97.脊髓灰质炎疫苗应在 -20°C 避光储存,运输过程应在冷藏条件下进行。

98.高血压患者的健康管理服务对象是辖区内35岁及以上原发性高血压患者。

99.自出生至1岁是婴儿期,自1岁至满3周岁为幼儿期。

100.体重计算公式:2岁至青春前期儿童体重(kg)=年龄(岁) $\times 2+7$ (或8)。



乡村全科执业助理医师资格考试考前 100 考题

1. 小儿上呼吸道感染, 出现哪种情况需要转诊

- A. 发热
- B. 高热惊厥
- C. 咽痛
- D. 腹痛
- E. 食欲减退

2. 引起上呼吸道感染最常见的病原是

- A. 衣原体
- B. 真菌
- C. 病毒
- D. 细菌
- E. 支原体

3. 引起咽结合膜炎的病毒是

- A. 呼吸道合胞病毒
- B. 溶血链球菌
- C. 柯萨奇病毒
- D. 麻疹病毒
- E. 偏肺病毒

4. 急性上呼吸道感染最主要的治疗措施是

- A. 抗生素治疗
- B. 中药治疗
- C. 对症治疗
- D. 解热、镇痛
- E. 止咳化痰

5. 患者, 男, 70 岁。因慢性阻塞性肺气肿入院治疗。今晨护理查房时发现患者烦躁不安, 有幻觉, 对自己所处的位置, 目前的时间无法做出正确的判断。医嘱给予吸氧, 最适合该患者的吸氧流量为

- A. 2 L/min
- B. 4 L/min
- C. 6 L/min
- D. 8 L/min

E. 10 L/min

6. 不属于阻塞性肺气肿的体征是

- A. 桶状胸
- B. 触觉语颤增强
- C. 肺下界与肝浊音界下降
- D. 叩诊呈过清音、心浊音界缩小或不易叩出
- E. 肺泡呼吸音降低, 呼气明显延长

叩出

E. 肺泡呼吸音降低, 呼气明显延长

7. 患者, 男, 50 岁。慢性咳嗽、咳痰 20 年, 加重伴气短 1 周。查体: T36.8℃, 双肺呼吸音减弱, 语音震颤减弱, 叩诊呈过清音。该患者最可能的诊断是

- A. 气胸
- B. 心力衰竭
- C. 慢性阻塞性肺疾病
- D. 支气管扩张
- E. 支气管哮喘

8. 患者, 男, 60 岁。活动后气急 3 年, 轻微咳嗽, 咳少量黏液痰。体检: 呼吸急促, 双肺叩诊呈过清音, 呼吸音减弱, 无啰音。X 线胸片显示双肺野透亮度增加, 膈肌低平。该病例诊断为

- A. 慢性支气管炎
- B. 支气管哮喘
- C. 慢性肺源性心脏病
- D. 慢性阻塞性肺疾病(气肿型)
- E. 慢性阻塞性肺疾病(支气管炎型)

9. 患者, 男, 59 岁。有咳嗽史 7 年, 肺功能测定, 肺活量占预计值百分比为 84%, FEV₁/FVC 为 54%。最可能的诊断是

- A. 弥散功能障碍
- B. 限制性通气功能障碍
- C. 阻塞性通气功能障碍
- D. 混合性通气功能障碍
- E. 正常

10.患者,女,20岁。反复发作喘息、呼吸困难、咳嗽2年。体检:双肺散在哮鸣音,心脏无异常。下列检查结果中有助于明确诊断的是

- A.最大呼气流量显著降低
- B.一秒钟用力呼气容积降低
- C.最大呼气中段流量降低
- D.支气管舒张试验阳性
- E.X线胸片显示肺纹理稍多

11.控制哮喘急性发作期的首选药物是

- A.倍氯米松吸入
- B.色甘酸钠吸入
- C.沙丁胺醇吸入
- D.异丙肾上腺素吸入
- E.氨茶碱口服

12.患者,女,35岁。支气管哮喘重度发作2天,使用氨茶碱、沙丁胺醇、大剂量激素治疗无效。体检:呼吸浅快,口唇发绀,神志不清,双肺哮鸣音较弱,血气分析:PaO₂ 50 mmHg, PaCO₂ 70 mmHg。进一步救治措施为

- A.静脉推注地塞米松
- B.给予高浓度吸氧
- C.静脉滴注5%碳酸氢钠
- D.联合应用抗生素静脉滴注
- E.气管插管,正压机械通气

13.肺炎支原体肺炎治疗首选的药物是

- A.青霉素
- B.链霉素
- C.头孢呋肟
- D.红霉素
- E.丁胺卡那霉素

14.链球菌肺炎应用抗生素治疗,应持续至体温正常后

- A.2~4天
- B.5~7天
- C.8~9天
- D.10~12天
- E.2周

15.金黄色葡萄球菌肺炎并发的胸腔积液最常为

- A.漏出液
- B.渗出液
- C.脓性胸液
- D.血性胸液
- E.乳糜性胸液

16.充血性心力衰竭所产生的胸腔积液为

- A.漏出液
- B.渗出液
- C.脓性胸液
- D.血性胸液
- E.乳糜性胸液

17.胸导管阻塞或破裂所致的胸腔积液为

- A.漏出液
- B.渗出液
- C.脓性胸液
- D.血性胸液
- E.乳糜性胸液

18.关于结核性胸膜炎特点的描述错误的是

- A.多见于中青年
- B.起病多缓慢
- C.可有结核中毒症状
- D.X线胸片可呈肋膈角消失或外高内低影
- E.X线胸片除胸腔积液影外,还应有肺内结核灶

19.下列不符合原发型肺结核特点的是

- A.CT检查肺纹理增重
- B.X线胸片表现为哑铃形阴影
- C.结核病家族接触史
- D.多见于少年儿童
- E.结核菌素试验多为强阳性

20.洋地黄中毒最常见的心电图表现是

- A.心房颤动

- B.室性期前收缩
C.房性期前收缩
D.ST-T 缺血性改变
E.房室传导阻滞
- 21.老年心力衰竭患者症状加重最常见的诱因是
- A.过度劳累
B.摄入液体过多
C.心肌缺血
D.室性期前收缩
E.呼吸道感染
- 22.强心苷治疗心衰的最基本作用是
- A.加强心肌收缩性
B.降低室壁张力,降低心肌耗氧量
C.加快心房与心室肌传导
D.降低心率
E.缩小扩大的心室容积
- 23.临床诊断急性胆囊炎最主要的根据是
- A.右上腹持续性剧痛
B.Murphy 征阳性
C.胆囊区压痛
D.黄疸
E.白细胞计数增高
- 24.以下疾病最常出现尿白细胞管型的是
- A.急性肾盂肾炎
B.微小病变型肾病
C.IgA 肾病
D.急性肾小管坏死
E.急性肾小球肾炎
- 25.慢性肾衰竭最常并发的电解质及酸碱平衡紊乱是
- A.高钾血症、代谢性酸中毒
B.低钾血症、代谢性酸中毒
C.高钾血症、呼吸性酸中毒
D.低钾血症、呼吸性碱中毒
E.高钾血症、代谢性碱中毒
- 26.对药物治疗无效的反复发作性室性心动过速/室颤的心力衰竭患者,最适宜的治疗为
- A.服用阿托品
B.植入型心脏转复除颤器
C.服用奎尼丁
D.植入房室顺序起搏器
E.静脉维拉帕米
- 27.患者,男,35岁。阵发性心悸3年,发作时按摩颈动脉窦心悸可突然终止。发作时心电图示:心室率190次/分,逆行P波,QRS波群形态与时限正常。该患者最可能的诊断是
- A.心房颤动
B.窦性心动过速
C.房性期前收缩
D.阵发性室性心动过速
E.阵发性室上性心动过速
- 28.最易引起血流动力学异常的是
- A.心房扑动
B.心房颤动
C.窦性心动过速
D.阵发性室上性心动过速
E.持续性室性心动过速
- 29.室性期前收缩引起心悸的感觉正确的是
- A.恐惧感
B.紧缩感
C.停跳感
D.饥饿感
E.灼热感
- 30.下列治疗高血压患者的常用药物错误的是
- A.钙通道阻滞剂
B.肾素血管紧张素转换酶抑制剂
C.血管紧张素受体阻滞剂
D.利尿剂
E.β受体激动剂

31. 患者,男,32岁。发现血压增高3年。近1年血压持续为170~200/130~140 mmHg,近1周头痛、视物模糊。眼底检查发现视乳头水肿。最可能的诊断是

- A. 急性视乳头病变
- B. 脑出血
- C. 恶性高血压
- D. 脑梗死
- E. 高血压脑病

32. 患者,女,60岁。患高血压20年,2年前患急性前壁心肌梗死。门诊测血压22.7/13.3 kPa (170/100 mmHg),心率96次/分。该患者最佳的治疗药物是

- A. 吲达帕胺
- B. 维拉帕米
- C. 美托洛尔
- D. 卡托普利
- E. 哌唑嗪

33. 合并双侧肾动脉狭窄的高血压患者降压不宜选用下列哪种药物

- A. 利尿药
- B. 血管紧张素转换酶抑制剂
- C. 钙通道阻滞剂
- D. β 受体阻滞剂
- E. α 受体阻滞剂

34. 心绞痛急性发作时,为迅速缓解症状,应首选

- A. 皮下注射阿托品
- B. 肌内注射哌替啶
- C. 口服对乙酰氨基酚
- D. 舌下含化硝酸甘油
- E. 口服硝酸甘油

35. 急性心肌梗死早期最重要的治疗措施是

- A. 抗心绞痛
- B. 消除心律失常
- C. 补充血量
- D. 心肌再灌注

E. 增加心肌营养

36. 诊断冠心病最常用的非创伤性检查方法是

- A. 休息时心电图
- B. 24小时动态心电图
- C. 心电图运动负荷试验
- D. 超声心动图
- E. 心脏CT检查

37. 确定冠状动脉狭窄部位和严重程度的最佳检查是

- A. 心电图
- B. 胸部X线
- C. 超声心动图
- D. 动态心电图
- E. 冠状动脉造影

38. 判断胃食管反流病有无反酸最可靠的检查是

- A. 24小时食管pH监测
- B. 内镜检查
- C. 食管压力测定
- D. 食管酸滴注试验
- E. 食管吞钡X线检查

39. 严重烧伤患者出现呕血、黑便,最可能的原因是

- A. 食管胃底静脉曲张破裂
- B. 消化性溃疡
- C. Curling 溃疡
- D. A型胃炎
- E. Cushing 溃疡

40. 慢性萎缩性胃炎的病理改变中属于癌前病变的是

- A. 明显肠上皮化生
- B. 中度以上不典型增生
- C. 胃小凹上皮增生
- D. 假幽门腺化生
- E. 假幽门腺化生伴肠上皮化生

41. 风热咳嗽选用的中成药为

- A. 橘红痰咳液

- B.半夏糖浆
C.急支糖浆
D.蛇胆川贝枇杷膏
E.十味龙胆花颗粒
- 42.肝阳头痛选用的代表方是
A.银翘散
B.头风痛胶囊
C.川芎茶调散
D.天麻钩藤颗粒
E.养血清脑颗粒
- 43.下列哪一项不是瘀血阻络胁痛的特点
A.肋肋刺痛
B.胸闷腹胀
C.痛有定处
D.入夜痛甚
E.舌质紫暗
- 44.胁痛肝络失养证选用的中成药是
A.六味地黄丸
B.柴胡舒肝丸
C.清肝明目丸
D.血府逐瘀丸
E.逍遥丸
- 45.泄泻食滞肠胃证选用的中成药为
A.四神丸
B.保和丸
C.香连片
D.枳实导滞丸
E.香砂养胃丸
- 46.内痔的好发部位是
A.膀胱截石位 3、7、11 点
B.膀胱截石位 6、9、12 点
C.膀胱截石位 3、6、9 点
D.膀胱截石位 5、7、11 点
E.膀胱截石位 2、5、11 点
- 47.瘀血腰痛,治宜选用
A.舒筋活血片
B.小活络丸
C.血府逐瘀胶囊
D.膈下逐瘀汤
E.补阳还五汤
- 48.治疗行痹,应首选
A.乌头汤
B.薏苡仁汤
C.九味羌活丸
D.宣痹汤
E.尪痹颗粒
- 49.哪一项不是寒凝血瘀型痛经的主要证候
A.经行小腹冷痛,得热痛减
B.经行小腹疼痛,拒按
C.经行量少,色淡红,质稀薄
D.面色青白,肢冷畏寒
E.舌黯,苔白,脉沉紧
- 50.肾虚型月经先后无定期的首选中成药是
A.右归丸
B.左归丸
C.定经汤
D.知柏地黄丸
E.补肾地黄丸
- 51.藿香正气液适用于小儿泄泻的哪种证型
A.风寒泄泻
B.脾虚泄泻
C.风热泄泻
D.湿热泄泻
E.伤食泄泻
- 52.漏肩风手阳明经证的针灸配穴是
A.外关
B.后溪
C.合谷
D.列缺
E.内关
- 53.患者咳嗽痰稀薄色白,咽痒,常伴鼻塞,恶寒,发热,苔薄白,脉浮紧。属咳嗽之

何证

- A. 风寒咳嗽
- B. 风热咳嗽
- C. 燥热咳嗽
- D. 凉燥咳嗽
- E. 肝火犯肺

54. 患者, 男性, 31 岁。胃痛暴作, 恶寒喜暖, 脘腹得温则痛减, 口淡不渴, 喜热饮, 舌苔薄白, 脉弦紧。治疗应首选

- A. 藿朴夏苓汤
- B. 桂枝合剂
- C. 小建中颗粒
- D. 黄芪建中汤
- E. 良附丸

55. 某患者, 大便干结, 排解困难数月, 伴身热心烦, 腹胀满痛, 口干口臭, 小便短赤, 舌红, 苔黄燥, 脉滑数。最佳选方为

- A. 麻仁丸
- B. 更衣丸
- C. 大承气汤
- D. 增液汤
- E. 润肠丸

56. 下列表述中属于证的是

- A. 胸痛
- B. 水痘
- C. 恶心
- D. 风热感冒
- E. 恶寒发热

57. 以下哪项不是面色发黑所属病证

- A. 水饮
- B. 湿证
- C. 肾虚
- D. 寒证
- E. 瘀血

58. 咳声不扬, 痰黄难咯者属

- A. 痰湿阻肺
- B. 热邪犯肺
- C. 燥邪犯肺

D. 肺肾阳虚

E. 寒邪犯肺

59. 尿液散发烂苹果味多见于

- A. 消渴病
- B. 失血
- C. 脏腑败坏
- D. 瘟疫

E. 水肿病晚期

60. 恶寒战栗与高热交替发作, 发有定时, 此为

- A. 少阳病
- B. 疟疾
- C. 热入血室
- D. 阳明病
- E. 表寒证

61. 风热表证的特征是

- A. 恶寒重发热轻
- B. 恶寒轻发热轻
- C. 发热重恶寒轻
- D. 发热重恶寒重
- E. 发热轻而恶风自汗

62. 迟脉的主病是

- A. 虚热证
- B. 痰饮
- C. 寒证
- D. 血瘀
- E. 气滞

63. 数脉一息是

- A. 五到七至
- B. 四到七至
- C. 六到七至
- D. 五到六至
- E. 六到八至

64. 表证与里证最主要的鉴别点是

- A. 寒热是否并见
- B. 是否有汗
- C. 舌苔是黄是白
- D. 是否头身疼痛

- E. 是否咳嗽有痰
65. 属于艾炷灸的是
- A. 温针灸
 - B. 隔盐灸
 - C. 回旋灸
 - D. 温和灸
 - E. 蒜泥灸
66. 足三阴经在内踝上 8 寸以下的分布规律是
- A. 厥阴在前、太阴在中、少阴在后
 - B. 少阴在前、厥阴在中、太阴在后
 - C. 厥阴在前、少阴在中、太阴在后
 - D. 太阴在前、厥阴在中、少阴在后
 - E. 太阴在前、少阴在中、厥阴在后
67. 治疗风寒感冒,常用的中成药是
- A. 银翘解毒丸
 - B. 正柴胡饮颗粒
 - C. 通宣理肺丸
 - D. 川芎茶调散
 - E. 藿香正气片
68. 疖病的好发部位是
- A. 头面
 - B. 四肢
 - C. 胸部
 - D. 项后发际
 - E. 身体内侧
69. 治疗内伤发热之阴虚发热证,应选用的中成药是
- A. 一贯煎
 - B. 麦味地黄丸
 - C. 知柏地黄丸
 - D. 当归六黄丸
 - E. 左归丸
70. 由于气滞血瘀而致痛经,应选用的中成药是
- A. 痛经丸
 - B. 血府逐瘀胶囊
 - C. 少腹逐瘀颗粒
 - D. 柴胡疏肝丸
 - E. 开郁种玉汤
71. 餐具消毒首选的方法是
- A. 煮沸消毒 15~30 分钟
 - B. 高压蒸汽消毒 15~20 分钟
 - C. 消毒剂溶液浸泡 30 分钟
 - D. 干热灭菌 1~2 小时
 - E. 流动蒸汽消毒 30 分钟
72. 下面哪个因素会使人群易感性降低
- A. 计划免疫
 - B. 新生儿增加
 - C. 易感人口迁入
 - D. 免疫人口免疫力自然消退
 - E. 免疫人口死亡
73. 以下哪种疾病不属于乙类传染病
- A. 麻疹
 - B. 流行性感 冒
 - C. 伤寒和副伤寒
 - D. 乙型脑炎
 - E. 狂犬病
74. 社区卫生服务计划的内容不包括
- A. 时间安排和经费预算
 - B. 服务对象的人数
 - C. 活动地点和指标
 - D. 本活动的长期健康效益
 - E. 质量控制措施
75. 下列哪项不属于第一级预防
- A. 预防生活方式疾病
 - B. 医生同病人共同检测疾病
 - C. 预防接种和计划免疫
 - D. 保持良好的社会心理状态
 - E. 以上都不属于
76. 根据可预防的疾病负担和费用效果分析,下列临床预防服务项目中最优先推荐的措施是
- A. 流感的免疫接种
 - B. 血脂异常的筛检
 - C. 糖尿病的筛检

- D.骨质疏松的筛检
E.阿司匹林预防心脑血管疾病
- 77.下列不属于初级卫生保健内容的是
A.针对主要卫生问题及其预防控制方法的健康教育
B.促进食物的供应和必要的营养
C.提供基本药物
D.主要传染病的预防接种
E.为居民提供免费住院服务
- 78.为预防胎儿发生神经管畸形,孕期应补充叶酸,开始补充的时间应在
A.孕前3个月
B.孕后1个月
C.孕后2个月
D.孕后3个月
E.分娩前1个月
- 79.艾滋病传播途径的预防教育内容不包括
A.性传播预防教育
B.消化道传播预防教育
C.血液传播预防教育
D.母婴传播预防教育
E.吸毒与感染艾滋病病毒的关系及其危险性教育
- 80.下列哪项不属于肺结核的可疑症状
A.脓痰
B.咯血、血痰
C.不明原因消瘦
D.慢性咳嗽、咳痰 ≥ 2 周
E.盗汗
- 81.关于产褥期保健的说法错误的是
A.目的是防止产后出血
B.适当活动
C.可促进产后生理功能恢复
D.计划生育指导
E.产后8周去医院做产后健康检查
- 82.老年人的基础代谢,一般比年轻人

下降

- A.5%~10%
B.10%~15%
C.15%~20%
D.20%~25%
E.25%~30%
- 83.以下哪项不符合国家基本药物概念
A.适应基本医疗卫生需求
B.剂型适宜
C.能够保障供应
D.价格便宜
E.公众可公平获得
- 84.新农合对于年内没有动用农村合作医疗基金,可以进行几次常规性体检
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
E.5次
- 85.确定职业性肿瘤病因的主要依据应来自
A.病例分析
B.细胞学检查
C.病理学检查
D.动物实验
E.流行病学调查
- 86.以下不属于减毒活疫苗的是
A.卡介苗
B.脊髓灰质炎
C.风疹
D.甲型肝炎
E.百白破
- 87.关于卡介苗接种下述哪项是正确的
A.菌苗为无毒人型活结核菌
B.儿童每隔5年复种一次
C.卡介苗效果是绝对肯定的
D.接种前均需做结素试验
E.使人产生免疫力同时也产生变态反应

88.下面哪一项不是吸烟产生的主要有害物质

- A.潜在致癌性物质
- B.一氧化碳
- C.尼古丁
- D.氮氧化物
- E.焦油

89.健康教育的对象是

- A.全体人群
- B.健康人群
- C.亚健康人群
- D.患者
- E.隐性感染者

90.某山区为碘缺乏病的流行地区,如果已经引起了群众的重视,但群众不了解病因,应重点采取哪项措施

- A.利用媒体宣传,引起注意
- B.积极强化正确的行为
- C.提供碘盐的使用方法
- D.进行知识的普及教育
- E.以上都不能达到目的

91.下列说法正确的是

A.测定 60 名正常成年女性血小板数所得资料只能是计量资料

B.统计工作步骤中最重要的是分析资料

C.概率是描述某随机事件发生的可能性大小的指标

- D.样本一定具有随机性
- E.样本的指标称为参数

92.下列关于统计表制作的叙述,正确的是

- A.纵标目间用竖线分隔
- B.横、纵标目用斜线分隔
- C.要求各种指标小数位数一致
- D.一张表应包含尽量多的内容
- E.统计表通常包括标题、标目、线条、数字 4 部分

93.三间分布的概念是包含

- A.人群、时间、地区
- B.疾病、暴发、地区
- C.病原、人群、地点
- D.医生、护士、病人
- E.预防、管理、统筹

94.疾病监测采用的方法属于

- A.描述性研究
- B.分析性研究
- C.实验性研究
- D.理论性研究
- E.包括以上四种

95.下列哪项不属于乡村医生在执业活动中享有的权利

- A.出具相应的医学证明
- B.参加专业学术团体
- C.参加业务培训和教育
- D.获取报酬
- E.树立敬业精神

96.目前国家免疫规划的疫苗不包括

- A.卡介苗
- B.乙型肝炎疫苗
- C.麻疹疫苗
- D.脊髓灰质炎疫苗
- E.甲肝疫苗

97.助理医师张某,中专学历,在取得助理医师资格证并注册后,还需在医疗机构中工作满几年才能参加执业医师考试

- A.6 年
- B.5 年
- C.4 年
- D.3 年
- E.2 年

98.医师在执业活动中,有下列行为之一的,予以警告或责令暂停六个月以上一年以下执业活动,情节严重的,吊销其执业证书,构成犯罪的,追究其刑事责任,除了

- A.发生医疗纠纷的

B. 未经患者或者其家属同意,对患者进行试验性临床医疗的

C. 泄露患者隐私,造成严重后果的

D. 利用职务之便,索取、非法收受患者财物或者牟取其他不正当利益的

E. 发生自然灾害、突发重大伤亡事故等紧急情况时,不服从卫生行政部门调遣的

99. 医师经注册后,应当按照以下注册的内容执业

A. 执业范围

B. 执业地点

C. 执业范围,执业类别

D. 执业范围,执业类别,医疗机构

E. 执业范围,执业类别,执业地点

100. 李某因患炭疽死亡,依据《传染病防治法》的规定,对其尸体应

A. 立即进行卫生处理,就近火化

B. 必要时可将尸体卫生处理后火化

C. 立即进行消毒处理后火化

D. 必要时可将尸体消毒处理后火化

E. 在指定场所卫生处理后火化



参考答案

- 1.【答案】B
- 2.【答案】C
- 3.【答案】C
- 4.【答案】C
- 5.【答案】A
- 6.【答案】B
- 7.【答案】C
- 8.【答案】D
- 9.【答案】C
- 10.【答案】D
- 11.【答案】C
- 12.【答案】E
- 13.【答案】D
- 14.【答案】D
- 15.【答案】C
- 16.【答案】A
- 17.【答案】E
- 18.【答案】E
- 19.【答案】A
- 20.【答案】B
- 21.【答案】E
- 22.【答案】A
- 23.【答案】B
- 24.【答案】A
- 25.【答案】A
- 26.【答案】B
- 27.【答案】E
- 28.【答案】E
- 29.【答案】C
- 30.【答案】E
- 31.【答案】E
- 32.【答案】C
- 33.【答案】B
- 34.【答案】D
- 35.【答案】D
- 36.【答案】C
- 37.【答案】E
- 38.【答案】A
- 39.【答案】C
- 40.【答案】B
- 41.【答案】C
- 42.【答案】D
- 43.【答案】B
- 44.【答案】A
- 45.【答案】D
- 46.【答案】A
- 47.【答案】A
- 48.【答案】C
- 49.【答案】C
- 50.【答案】B
- 51.【答案】A
- 52.【答案】C
- 53.【答案】A
- 54.【答案】E
- 55.【答案】A
- 56.【答案】D
- 57.【答案】B
- 58.【答案】B
- 59.【答案】A
- 60.【答案】B
- 61.【答案】C
- 62.【答案】C
- 63.【答案】A
- 64.【答案】A
- 65.【答案】B
- 66.【答案】A
- 67.【答案】B
- 68.【答案】D
- 69.【答案】C
- 70.【答案】B
- 71.【答案】A
- 72.【答案】A

- 73.【答案】B
- 74.【答案】D
- 75.【答案】B
- 76.【答案】E
- 77.【答案】E
- 78.【答案】A
- 79.【答案】B
- 80.【答案】A
- 81.【答案】E
- 82.【答案】C
- 83.【答案】D
- 84.【答案】A
- 85.【答案】E
- 86.【答案】E

- 87.【答案】E
- 88.【答案】D
- 89.【答案】A
- 90.【答案】D
- 91.【答案】C
- 92.【答案】E
- 93.【答案】A
- 94.【答案】A
- 95.【答案】E
- 96.【答案】E
- 97.【答案】B
- 98.【答案】A
- 99.【答案】E
- 100.【答案】A

金英杰
WWW.JINYINGJIE.COM

